

Preparación para 17 Hidroxiprogesterona post ACTH para niños



¿Cómo debes preparar al niño para el examen?

Lee cuidadosamente y sigue estas recomendaciones como preparación para tu examen

- Esta prueba se realiza en la sede de Dinámica en el Hospital Infantil Santa Ana, en Medellín, de lunes a viernes. Debes pedir cita previa en el teléfono 4447428.
- En las demás ciudades, desde nuestra línea de atención te indicarán el laboratorio donde debes realizarte este examen:
 - Bogotá: 489 7904
 - Cali: 380 8956
 - Barranquilla: 319 79 76
 - Resto del país: 01 8000 51 7736
- El niño no debe comer alimentos ni tomar bebidas entre 6 y 8 horas antes de la prueba.
- El niño debe estar en reposo 30 minutos antes de la prueba.
- El niño debe venir acompañado de un adulto responsable, mayor de 18 años y que no esté en situación de discapacidad.
- Duración de la prueba: 1 hora. Tanto el niño como su acompañante deben contar con disponibilidad para permanecer en el laboratorio el tiempo que dura la prueba. Te recomendamos llevar libros, juegos u otras actividades.

¿Qué documentos debes presentar?



Documento de identidad del niño

Orden médica vigente, este documento es fundamental para realizarte la prueba.



¿Qué cuidados debes tener con el niño durante el examen?

- El niño no debe comer alimentos ni tomar bebidas durante la prueba.
- Recuerda darle al personal del laboratorio los datos del niño: edad, peso, medicamentos que toma, dosis de los mismos, motivo de realización del examen, si padece de diabetes o hipoglicemia.
- Pregúntale a nuestro personal de salud los cuidados que debes tener con el niño durante el examen.



¿Qué cuidados debes tener después del examen?

El niño puede sufrir de picazón e irritación en el lugar donde le pusieron la inyección.

El niño puede sufrir de mareos, náuseas, sofoco, malestar y vómito.

Todos estos síntomas son muy leves, son transitorios y no tienen consecuencias permanentes

El niño puede volver a tomar sus medicamentos el día siguiente de la prueba, siempre siguiendo las recomendaciones de su médico.

En caso de que el niño tenga complicaciones con los medicamentos, debes llevarlo al servicio de urgencias.

Si tienes alguna duda, consulta con nuestro personal de salud.



¿Para qué sirve esta prueba?

- Ayuda a determinar si la glándula pituitaria o la glándula adrenal del niño funcionan normalmente.
- Se usa, más frecuentemente, cuando se sospecha alguna alteración en la glándula suprarrenal.
- Se realiza inyectándole al bebé la hormona adrenocorticotropa (ACTH).

¡Gracias por tener en cuenta estas recomendaciones que contribuirán con un correcto diagnóstico y el tratamiento que realmente necesitas!